단순유방촬영사진상 군집된 미세석회화 소견: 양성과 악성 병변의 조직학적 연관성¹

김 미 혜 · 오 기 근 · 정 우 희² · 유 석 종

목 적:유방촬영사진상 군집된 미세석회화 모양을 병리소견과 연관시키고 조직학적으로 양성, 양성석회화 소견을 비교하고자 한다.

대상 및 방법:수술 및 조직병리학적으로 확진된 24예(악성 10예, 양성 14예)를 대상으로 조직병리 슬라이드상 석회화의 위치, 주위 병변 그리고 모양을 분석하여 양성 및 악성의 차이점을 살피고, 이중 2예를 mapping연구와 파라핀블록의 단순유방촬영을 통해 단순유방사진상의 석회화모양을 병리조직학적소견과 연관시켜 보았다.

결 과:악성병변의 대부분(8/10, 80%)에서 석회화는 관강내에 위치하였으며, 양성병변에서는 관강 내(10/14, 71%) 및 관내 상피세포에(7/14, 50%) 위치하였다. 악성병변의 20%에서는 악성병변 및 그 주위의 양성병변에 위치한 석회화가 있었고, 10%에서는 악성병변주위의 양성병변에서만 석회화가 있었다. 악성병변에서는 판상(laminated) (6/10)의 석회화가 많았고 양성병변에서는 과립양(granular) (9/14), 소금모양(salty) (7/14)의 석회화가 있었다. 악성병변에서도 과립양(7/10), 소금모양(3/10)의 석회화가 있었는데 그 중 50%는 악성병변 주위의 양성병변내에서 보였다. 그리고 2예의 mapping연구에서 많은 양성석회화 중 일부분에서 악성이 의심되는 석회화소견이 있었는데 이 부위에서 비정형 상피세포증이 관찰되었다. 유방촬영사진상 후추모양(pepper), 섬세하거나 거칠은 과립양(fine or coarse granular), S 자형(S-shape), 둥근모양(punctate) 또는 소금모양은 조직슬라이드상 과립형, 소금모양에 해당되었고 유방촬영사진상 장형(linear), 가지형(branching), 쉼표모양(comma), 올챙이모양(tadpole), 벌레모양(wormiform)은 판상의 석회화에 해당되었다.

결 론:악성 및 양성병변에 동반하는 석회화의 조직학적 차이와 석회화모양의 유방사진-조직병리학적인 차이를 이용하여 임상적으로 도움을 줄 수 있을 것으로 생각된다. 조직학적으로 악성에 해당하는 판상석회화와 연관되는 장형, 가지형, 쉼표모양, 올챙이 그리고 벌레모양의 석회화가 유방촬영사진상 보일때 악성병변을 의심하여야 하며, 악성병변 및 양성병변 주위에도 각각 양성석회화, 양성석회화가 있을수 있으므로 확실한 양성석회화소견중 일부분에서 악성이 의심되는 석회화가 있는 경우에는 그 석회화부위와 그 주위조직까지 제거하고, 제거조직의 단순촬영(specimen radiography)으로 정확한 제거여부를 확인한 후 더 세밀한 조직학적 검사를 시행하여 양성병변에서 동반되는 유방암의 병변을 완치할 수 있도록 하여야 한다.

서 론

1951년 Leborgne에 의해 처음 언급된 군집된 미세석회화란 2mm이하의 미세석회화가 1cm²내에 5개 이상 있을 때로 정의하며, 종괴, 주위조직 변형소견과 함께 악성병변

을 시사하는 소견으로 알려져 왔다. 이 소견은 악성뿐 아니라, 섬유선증식증, 섬유선종, 상피세포증식증, 비정형상피세포증등의 양성병변에서 더 많이 발견될 수 있는 것으로 군집된 미세석회화의 60-70%가 이에 속한다(1-6). 일반적으로 석회화의 수가 많을수록, 크기가 작을수록, 그리고 모양이 다양할수록 악성을 시사한다고 하나(7), 양성과 중첩되는 소견이 많고 여러 학자에 의해 다양한 결과가 나왔을 뿐 아니라 조직학적 연관성이 정확하게 보고되어 있지 않아 필름상 군집된 미세석회화소견이 보이면 대부분에서 조직생검및 수술후 조직학적 확진이 필요하였다. 이에 저자는 양성, 양성 병변에 동반된 군집된 미세석회화소견이

¹연세대학교 의과대학 진단방사선과학교실

²연세대학교 의과대학 병리학교실

이 논문은 연세대학교 의과대학 1994년도 일반과제연구비에 의하여 이루어졌음

이 논문은 1994년 11월 19일 접수하여 1995년 2월 4일에 채택되었음

관찰되어 수술한 예에서 조직슬라이드상 석회화의 특성을 살폈으며, 유방촬영사진-조직슬라이드간의 석회화모양의 연관성을 찾아보았다.

대상 및 방법

1988년 1월부터 1994년 2월까지 연세대학교 의과대학 부속 영동세브란스병원에서 유방촬영상 군집된 미세석회화소견이 보여 수술로 확진된 환자를 대상으로 하였으며 이중 임의로 선택된 63명중 조직슬라이드상 석회화소견이 관찰이 관찰되었던 24예를 대상으로 하였다. 모두 여자환자였으며 나이는 35세에서 62세였고 평균연령은 48세였다. 단순유방촬영술은 Senographe 500T(CGR 13, Paris, France) 와 Senographe DMR(GE medical, Wisconsin, USA)를 이용하여 촬영하였다. 조직슬라이드상 악성및 양성석회화의 위치(관강내, 관상피세포근처, 간질세포), 주위병변및 석회화의 모양(과립상(granular), 소금모양(salty), 판상(laminated))을 관찰후 비교분석하였다. 또, 양성석회화가 우월하게 많고 일부에서 악성이 의심되는 석회화가 있는 2예를 수술후 mapping연구하였고, 석회화가 포함된 조직의 파라핀 블록 유방촬영술을 시행하여 유방촬영사진소견과 조직슬라이드상 석회화 모양의 연관성을 관찰하였다. 유방촬영사진상 석회화의 모양은 방사선과 전문의 2인 이상이 임의로 변경하여 Table 1과 같이 분류하였다.

결 과

악성, 양성 모든예에서 관강내, 관상피세포근처, 주위 기질에 석회화가 관찰되었다. 악성에서는 관강내 석회화가 많았고, 양성병변에서는 관상피세포근처의 석회화가 많았다($p < 0.05$, Table 2). 10예의 악성병변중 3 예에서 주위의 동반된 양성병변내에 석회화를 동반하고 있었고, 그 중 1 예에서는 악성병변내의 석회화 없이 양성병변내에서의 석회화만을 동반하였다(Table 3). 악성병변내의 석회

화는 판상이 많았고(6/10, $p < 0.05$), 양성병변에서는 과립양(10/14), 소금모양(7/14)이 많았다(Table 4). 악성에서도 과립양, 소금모양이 관찰되었는데 이중 50%는 주위 동반된 양성병변내에 있었다(Table 4, Fig. 1). 2예의 mapping연구와 파라핀 block 의 유방촬영사진을 통해 석회화 모양의 필름-조직학적소견을 비교 분석하였을때 필름상 보였던 후추모양, 섬세한 과립형, 섬세한 소금모양, S모양, 과립형 그리고 소금모양은 병리소견상으로는 과립형, 소금모양과 연관되었다. 필름상 장형, 가지형, 쉼표모양, 올챙이 모양 그리고 벌레모양의 석회화는 병리소견상 판상의 석회화와 연관되었다(Fig. 1-4). 대부분이 많은 양성 석회화를 가지고 있고 일부에서 악성이 의심되는 후추모양, 쉼표모양, 올챙이 모양의 석회화가 있는 2예를 수술후 mapping연구 했을 때 악성이 의심되는 석회화 부위에서 비정형 상피세포증이 발견되었다(Fig. 4).

고 찰

유방촬영사진상 관찰되는 석회화는 혈관벽석회화, 지방경색후 석회화, 피부석회화와 함께 선종식증, 낭종, 상피세포중식증, 비정형세포중식증등의 양성 병변및 유방암에서 관찰된다(8). 이들중 양성석회화는 악성에 비하여 크기가 크며 균일하고 모양도 둥근모양으로 균일한 모양이 많으며 밀집된 분포를 보이는 악성에 비해 넓게 분포되어 있다.

Table 2. Histopathologic Correlation: Location of Calcification

Location	Malignant (n=10)	Benign (n=14)
Epithelium	3	7(2)
Duct	8	10(2)
Stroma	3	2(2)

() atypical ductal hyperplasia

Table 3. Histopathologic Correlation: Pathology Adjacent to Calcifications

Pathology	Malignant (n=10)	Benign (n=14)
Fibrocystic disease	3	13(3)
Epithelial hyperplasia	0	4(1)
Atypical ductal hyperplasia	0	0
Intraductal carcinoma	8	0

() atypical ductal hyperplasia

Table 4. Histopathologic Correlation: Shape of Calcification

Shape	Malignant (n=10)	Benign (n=14)
Granular	7(3*)	9(3)
Salty	3(1*)	7(3)
Laminated	6	3(1)

() atypical ductal hyperplasia

(*) associated benign lesion adjacent to cancer

Table 1. Definition of Shape of Calcification on Mammography

Terminology	Size and Shape
Pepper	0.1 mm >, faint
Fine granular	0.1-0.2 mm, round
Coarse granular	0.1-0.2 mm, irregular
Punctate	0.2-2.0 mm, distinct and round
Salty	0.2-2.0 mm, distinct and angular
S-shape	< 2.0 mm, continuous S-shaped
Linear	< 2.0 mm, elongated
Branching	0.2-2.0 mm, x, y, z
Tadpole	0.2-2.0 mm
Comma	0.2-2.0 mm
Wormiform	0.2-2.0 mm, wavy and irregular linear

Fig. 1. Invasive Ductal Carcinoma

- a. Specimen-radiograph shows variable shaped clustered microcalcifications such as pepper, fine granular, linear, comma, tad-pole and wormiform (arrows)
- b, c. Microphotograph of the specimen show laminated(b. arrow) and salty calcifications(c. arrows) in malignant lesion (H-E stain, $\times 100$)
- d. Microphotograph of specimen show granular calcification in benign lesion adjacent to cancer (arrows)(H-E stain, $\times 100$)

Fig. 2. Epithelial Hyperplasia

- a. Paraffin block mammogram shows punctate(large arrow) and fine granular(small arrow) calcification
- b. Microphotograph of specimen show granular calcification(arrows)(H-E stain, $\times 100$)

a

b

Fig. 3. Fibrocystic Disease

a. Paraffin block mammogram shows salty (large arrow) and coarse granular (small arrow) calcifications

b. Microphotograph of specimen show salty calcifications (arrows) (H-E stain, ×100)

a

b

Fig. 4. Atypical Ductal Hyperplasia

a. Specimen radiograph shows multiple dense microcalcifications (large arrow) and focal pepper, comma calcifications (small arrows)

b. Mapping study shows calcification (red point), epithelial hyperplasia (black point) and focal atypical ductal hyperplasia (lines)

거칠고(coarse), 계란껍질모양(eggshell), 중력에 따라 움직이는 석회화가 대표적인 양성석회화로 알려져 왔다(8). 섬유선종의 석회화는 종괴중심에 거칠고 분명하게 그려지는 석회화 또는 바깥쪽에 테두리모양(rimlike)의 석회화를 보인다. 혈관벽의 석회화는 길고 평행하는 기차길형(railroad) 석회화가 특징적이고 낭종내의 석회화(milk of calcium in cyst)는 중력에 따라 움직이며 둥글거나 난원형, 또는 비정형(amorphous)의 석회화이다. 유방분비질환에서 오는 석회화는 두껍고 진하며 연속적이며 깨끗한 변연을 가지고있는 것이 특징적이며, 위치로는 유두아래, 양쪽성, 그리고 일측성으로도 오며 면포성암과 유사하게 분엽성(segmental) 분포를 보이기도 한다. 감별을 요하는 면포성 암의 석회화는 크기가 0.5mm이하로 작고 모양과 크기가 불균일하며 불연속적이고 석회화가 군집되어 있는 점이 양성과 다르다. 지방괴사후에 오는 석회화는 계란껍

질 모양을 보인다. 그 외 양성석회화로는 이물질로부터 오는 석회화(artifact)가 있는데 류마티스 관절염의 금치료, 카세트내 증감지의 상처, 필름에 묻은 머리카락등이 있다. 악성에서의 석회화는 양성에서 보다 군집되어 있고 모양과 크기에 있어서 다양하면서도 섬세하고 가지형이 많고 석회화의 수가 많다. 유방암중 20%가 유관내에 국한된 암으로 그중 70%가 단순유방촬영필름상의 석회화로 진단된다(9).

악성암의 석회화는 두종류로 분류되는데 그중 하나는 면포성암에서 오는 장형(elongated, rod-shape), 가지형(branching), 원주형(casting) 석회화로 이는 유관 상피세포에서 악성암세포가 유관내로 증식되어 들어가고 중심부위가 괴사 및 석회화되어 생긴다. 체모양(cribriform), 미세 유두상(micropapillary) 악성종양에서 오는 0.5cm 미만의 둥근모양(punctate), 기괴한(bizarre), 불규칙한

모양의 석회화는 유관내 유두상 돌출을 한 암세포사이에 유즙분비가 정체되어 생긴다고 생각된다. 하지만 위의 두 형이 함께 존재하는 경우가 많으므로 두종류에서 오는 석회화의 모양이 한예에서 모두 보이는 경우도 있다(9). 2 mm 이하의 미세석회화가 1cm²내 5개이상 모여있을때 군집된 미세석회화라고 하며 27-41%까지 악성으로 보고된다(10). 그러나 군집된 미세석회화 소견의 59-73%는 양성병변에서 나타나므로 불필요한 조직검사 및 수술을 피하기 위해서는 석회화소견의 양성, 악성간의 감별이 필요하다. 저자들이 경험한 63예에서 단순유방촬영필름상 군집된 미세석회화 소견이 관찰되었는데 조직슬라이드상 24예에서만 석회화소견이 관찰되었다. 이 원인으로 Carl등은 조직학블럭을 만드는 동안의 분실과 슬라이드 만드는 과정에서의 분실로 설명하였고(11), Mark등은 수술시 부적합한 제거가 25%, 병리학자의 비언급이 33%, 조직의 processing동안의 분실이 25% 그리고 oxalate crystal이 보이지 않은 경우가 17%로 발표하였는데(12), 저자의 경우도 상기와 같은 이유라고 생각된다. 석회화의 성분중 calcium oxalate crystal은 hematoxylin-eosin 염색이나 von-Kossa 염색법으로는 보이지 않고 polarized light microscopy또는 silver nitrate and rubeanic acid with 5% acetic acid로 염색했을때만 관찰된다고 한다 (13). 저자의 연구중에도 2예에서 조직학슬라이드에서 석회화가 관찰되지 않아 Gilda등과 같이 제거조직의 파라핀 블럭을 단순유방촬영하여 석회화의 위치를 결정한 후 이부위로 조직슬라이드를 제작, 석회화를 관찰할 수 있었다(14). 많은 연구에서 병리조직 소견상의 석회화위치를 관찰하였는데 악성예중 50%에서는 악성병변내에 국한되었는데 반해 50%에서는 주위의 양성병변내(30%), 또는 악성과 양성병변내에 공존하는 석회화(20%)를 보고하였다(9, 15-18). 본 연구의 악성에 10예의 조직슬라이드상 30%에서도 악성병변자체 및 주위에 같이 있던 양성병변에서 석회화를 발견하였다.

한편 2예의 mapping연구에서도 단순유방필름상 수많은 거친 과립양, 과립양, 소금모양의 양성석회화와 함께 일부분에서 잘보이지않는 후추모양, 쉼표모양, 올챙이 모양의 석회화가 주위조직변형과 동반되어 관찰되어 수술및 mapping을 시행하였는데 석회화가 있던 각각의 파라핀 블럭 촬영필름과 조직슬라이드와의 비교시 양성 석회화의 모양이 잘 연관되었고, 악성이 의심되는 석회화부위에서 양성 과 악성의 이행단계인 비정형상피세포증이 관찰되어 타 저자들의 보고와 일치한다고 사료된다.

결론적으로 악성 및 양성병변에 동반하는 석회화의 조직학적 차이와 석회화모양의 필름-조직병리학적 차이를 이용하여 임상적으로 도움을 줄 수 있을 것으로 생각된다. 또 악성이 의심되는 석회화 소견이 관찰되거나 확실한 양성석회화소견중 일부분에서 악성이 의심되는 석회화가 있는 경

우에는 그 석회화부위와 그 주위조직까지 제거하고, 제거조직의 단순촬영(specimen radiography)으로 정확한 제거여부를 확인한 후 더 세밀한 조직학적 검사를 시행하여 양성조직에서도 동반될 수 있는 유방암의 병변을 발견할 수 있도록 하여야 한다.

참 고 문 헌

1. Berenice BM, Joan L, Anderson TJ, Alastair EK: Microcalcification and its relationship to cancer of the breast: Experience in a screening clinic. *Clin Radiol* 1983;34:193-200
2. Gershon-CJ, Yiu LS, Berger SM. The diagnostic importance of cancerous patterns in roentgenography of breast Cancer. *AJR* 1962;88:1117-1125
3. Rodgers JV, Powell RW. Mammographic indications for biopsy of clinically normal breast: correlation with pathologic findings in 72cases. *AJR* 1972;115:794-800
4. Bauermeister DE, Hall MH. Specimen radiology-A mandatory adjunct to mammography. *Am clin pathol* 1973;59:782-789
5. Rosen PP, Snyder RE, Robbin G. Specimen radiography for nonpalpable breast lesions found by mammography: procedures and results. *Cancer* 1974;34:2028-2033
6. Roses DF, Harris MN, Gortstein F, Gumpert SL. Biopsy for microcalcification detected by mammography. *Surgery* 1980;87:248-252
7. William AM, Katherine DK: Isolated microcalcifications in the breast: radiologic-pathologic correlation. *Radiology* 1978;127:335-341
8. Sarrah SL, Edward AS. Sedimented calcium in benign breast cysts: the full spectrum of mammographic presentations. *AJR* 1989;152:967-971
9. Lawrence WB: Mammographic analysis of calcification. *Radiol Clin North Am* 1992;30:93-105
10. Ellen SD, Patricia LA, Sana T, Marie AB, Deborah CS: Mammographic and histologic correlations of microcalcification. *RadioGraphics* 1990;10:577-589
11. Carl JD, Frank RR, Michael AD, Vanessa JB: Calcium oxalate crystals in breast biopsy. *Radiology* 1991;180:397-401
12. Mark AS, Mitchel SK: Calcifications in breast biopsy specimens: Discrepancies in radiologic-pathologic identification. *Radiology* 1991;179:111-114
13. Carmen TE, Elvio S, Adel EN: Calcium oxalate crystals in breast biopsies. The missing microcalcifications. *Am J Surg pathol* 1990;114:961-968
14. Gilda C, Eklund GW. Paraffin block radiography following breast biopsies: use of orthogonal views. *Radiology* 1991;180:873-874
15. Marc JH, Homa S, Thomas JS, Douglas JM: The relationship of mammographic microcalcification to histologic malignancy: radiologic-pathologic correlation. *AJR* 1989;153:1187-1189
16. Joseph JP, Douglas RT, Michael S, Raymond R: Excisional breast biopsy and roentgenographic examination for mammographically detected microcalcification. *Am J Surg* 1983;145:684-686
17. Harold JC, William FF, Olcay Sc, Byungkyu C: Mammographic and pathologic correlation of microcalcification in disease of the breast. *Surg Gynecol and Obstet* 1992;155:689-696
18. Adelaida FM, Miguel PE, Josep MT, et al. Breast tumors: Composition of microcalcifications. *Radiology* 1988;169:325-327

Clustered Microcalcifications on Mammography: Histopathologic Correlation in Benign and Malignant Lesions¹

Mi Hye Kim, M.D., Ki Keun Oh, M.D., Woo Hee Jung, M.D.², Sock Jong Ryu, M.D.

¹ Department of Diagnostic Radiology, College of Medicine, Yonsei University

² Department of Pathology, College of Medicine, Yonsei University

Purpose: To evaluate differential points of clustered microcalcification in malignant and benign lesions on histopathology and correlate with mammographic findings.

Materials and Methods: Authors evaluated differential points of malignant and benign calcifications in histopathologically confirmed 24 cases. In two patients, mapping studies and paraffin block mammographic examinations were done to correlate calcification on mammography with histopathologic morphology.

Result: On histopathology, malignant calcifications were located in ductal lumen, while benign ones were usually located in ductal epithelium ($p < 0.05$). However, associated three benign lesions of the 10 malignant lesions showed still benign calcifications adjacent to proven cancer. The typical malignant calcifications were the shape of lamination, while benign calcifications showed granular and salty on light microscope. In 2 mapping studies, malignant-looking calcifications within the area of predominant benign calcifications yielded atypical ductal hyperplasia. Mammographic pepper, granular, punctate, salty and S-shaped calcifications were correlated with granular and salty calcification on light microscope. Mammographic linear, branching, comma, tadpole and wormiform calcifications were correlated with histopathologic laminated calcification.

Conclusion: Authors have recognized about characteristics of malignant Vs. benign clustered microcalcifications on histopathology. Authors concluded that if malignant-looking calcification such as linear, branching, comma, tadpole and wormiform are present in an area of predominant benign calcifications, specimen radiographic correlation and mapping study will be necessary for better demonstration of the atypical ductal hyperplasia, hidden or associated breast cancer.

Index Words: Breast radiography

Breast, calcification

Breast neoplasms

Breast neoplasms, calcification

Address reprint requests to: Mi Hye Kim, M.D., Department of Diagnostic Radiology, Yongdong Severance Hospital, College of Medicine, Yonsei University, 146-92, Dogok-dong, Kangnam-ku, Seoul, 135-270 Korea.
Tel. 82-2-3450-3622 Fax. 82-2-562-5472