



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

열발작으로 응급실을 방문한 환자의
임상 양상

연세대학교 대학원

의 학 과

김 종 민

열발작으로 응급실을 방문한 환자의
임상 양상

지도교수 이 순 민

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2023 년 12 월


연세대학교 대학원

의 학 과

김 종 민

김종민 의 석사 학위논문을 인준함

심사위원 _____ 이순민 

심사위원 _____ 채현욱 

심사위원 _____ 유제성 

연세대학교 대학원

2023 년 12 월

감사의 글

<차례>

국문요약	iii
I. 서론	1
II. 재료 및 방법	2
1. 연구설계	2
2. 연구방법	2
3. 통계분석	3
III. 결과	4
IV. 고찰	8
V. 결론	10
참고문헌	11
ABSTRACT	13
게재 리스트	15

그림 차례

그림 1. Annual trend of febrile seizure-related visits from 2013 through 2022	6
그림 2. Monthly trend of febrile seizure-related visits	6

표 차례

표 1. Clinical characteristics of the study population	5
표 2. Comparisons of associated factors between the children with and without recurrence	7
표 3. Clinical aspects of febrile seizures before and after the coronavirus disease 2019 pandemic	7

국문요약

열발작으로 응급실을 방문한 환자의 임상 양상

<지도교수 이순민>

연세대학교 대학원 의학과

김종민

목적: 열발작으로 응급실 2곳을 방문한 소아를 대상으로 임상적 특성, 재발, 신경학적 결과 및 코로나바이러스병-19 범유행의 영향을 분석하고자 한다.

방법: 2013년부터 2022년까지 2개 병원의 응급실에서 열 발작이 진단된 6-60개월 어린이 2,510명의 3,172회의 의무 기록을 후향적으로 검토하였다. 열발작의 재발에 대한 임상적 특성 및 관련 요인을 분석하였다. 추가적으로 코로나바이러스병-19 범유행 관련 방문 양상 변화(2017-2019 대 2020-2022)를 분석하였다.

결과: 응급실에 내원한 총 3,172건의 열발작 관련 방문이 2,510명의 어린이에서 확인되었다. 이 중 890명(35.5%)이 열발작의 재발을 경험하였다. 열발작의 재발은 남자에서 더 많았으며(63.3% 대 57.8%; $P = 0.007$), 5분 이상 지속되는 발작(16.6% 대 12.7%; $P = 0.007$), 열발작의 가족력(23.7% 대 16.2%; $P < 0.001$), 복합 열발작(13.3% 대 8.0%; $P < 0.001$), 이후에 진단된 뇌전증(9.1% 대 3.0%; $P < 0.001$)과 관련이 있었다. 범유행 기간 동안 범유행 이전에 비하여 응급실에 내원한 열발작 관련 방문 횟수의 감소(1,274건에서 383건), 복합 열발작의 비율 증가(9.3% 대 13.8%; $P = 0.012$), 재발하는 열발작의 비율(49.4% 대 33.4%; $P < 0.001$)이 감소한 것을 확인할 수 있었다.

결론: 본 연구에서는 열발작의 재발과 관련된 요인을 확인하였고, 코로나바이러스병-19 범유행 기간 동안 복합 열발작의 증가와 재발 감소를 확인하였다. 이러한 결과는 향후 응급실에서 열발작 환자를 치료하는데 도움이 될 수 있을 것이다.

핵심되는 말 : 코로나바이러스병-19, 역학, 재발, 열발작

열발작으로 응급실을 방문한 환자의 임상 양상

<지도교수 이순민>

연세대학교 대학원 의학과

김종민

I. 서론

열발작은 영유아에서 발생하는 가장 흔한 발작으로, 응급실을 방문하는 흔한 이유 중 하나이다¹⁻⁴. 열발작 재발에 관하여 많은 연구가 이뤄졌으며 약 1/3에서 발생한다⁴.

열발작 재발은 발병 당시 나이, 열발작 가족력, 발작 지속 시간, 24시간 내 반복 발작, 발작 형태, 발병 당시 체온 등의 영향을 받을 수 있다⁵⁻⁷ 열발작 환자의 신경학적 예후는 양호하며, 열 없는 발작(afebrile seizure)으로 진행하거나 신경학적 결손 또는 사망에 이르는 경우가 드물다. 그러나 뇌전증 가족력, 열발작의 잦은 재발, 비전형적 열발작은 향후 뇌전증으로 이어질 수 있다⁵⁻⁷.

본 연구에서는 열발작으로 2개 병원 응급실을 방문한 소아 환자의 임상 양상, 재발, 신경학적 예후, 열발작 연관 방문에 대한 코로나바이러스병-19 범유행의 영향을 분석하고자 한다.

II. 재료 및 방법

1. 연구 설계

본 연구는 후향적 의무기록 연구로서 연세대학교 세브란스병원 또는 강남세브란스병원 응급실을 방문한 열발작 환자의 의무기록을 분석했다. 2013년 1월-2022년 12월 상기 2개 응급실을 방문한 6-60개월의 소아 중 열발작을 진단받은 환자를 대상으로 했다. 열발작은 응급실 방문 전 또는 체류 중 열($\geq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$)을 동반하여 발생한 발작으로 정의했다. 응급실 방문 전 뇌전증 진단, 뇌 병소, 열 없는 발작, 외상 연관 발작, 중추신경계 감염, 대사 이상 환자는 제외했다. 본 연구는 강남세브란스병원 임상연구심의위원회의 승인을 받았고, 후향적 의무기록 연구로 동의서는 면제됐다(IRB no 3-2022-0490).

2. 연구 방법

의무기록을 바탕으로 수집한 임상적 특징은 다음과 같다. 환자의 성별, 방문 당시 나이(월), 입원 여부, 발작 지속 시간 및 양상, 열발작 가족력, 복합 열발작 여부, 열발작 시 병발(竝發) 질환을 확인했다. 과거력은 응급실 방문 당시 보호자 진술에 근거한 의무기록으로 확인했으며, 기타 항목에는 부모, 형제를 제외한 친척의 가족력까지 포함했다. 열발작 지속 시간이 15분 이상, 국소 발작 또는 24시간 이내 2회 이상 발작을 복합 열발작으로 정의했다^{2,8)}. 임상양상은 같은 환자가 열발작으로 2회 이상 방문한 경우를 고려하여, 환자별 분석 대신 응급실 방문건수별 분석을 시행했다. 단, 열발작 재발 여부 및 재발과 연관된 변수 분석은 환자별로 분석했다. 열발작 재발은 열발작으로 2회 이상 방문 기록이 있거나, 첫 방문 시 열발작 과거력이 확인된 경우로 정의했다. 신경학적 예후와 관련하여, 열발작으로 방문 이후 뇌전증, 발달 지연, 자폐증, 뇌성마비 진단 여부를 확인했으며, 2022년까지 2개 병원 의무기록을 확인했다. 추가로, 연도별, 월별 열발작 관련 방문 건수 및 코로나바이러스병-19 범유행 관련 방문 양상 변화(2017-2019 대 2020-2022)를 분석했다.

3. 통계 분석

자료 분석은 SPSS Statistics ver. 22 (IBM Corp.)를 사용했다. 각 변수의 빈도 차이는 카이제곱 검정을 사용하여 비교했다. $P < 0.05$ 를 통계적으로 유의하다고 정의했다.

Ⅲ. 결과

열발작 연관 방문 총 3,278건 중, 방문 전 뇌전증을 진단 79건, 뇌 병소 12건, 열 없는 발작 4건, 외상 연관 발작 8건, 중추신경계 감염 1건, 대사 이상 2건을 제외한 총 3,172건(2,510명)의 의무기록을 후향적으로 검토했다. 열발작의 임상양상은 표 1.과 같다. 남자가 더 흔했고, 나이대 중 13-24개월이 가장 많았다. 열발작 가족력은 647건(20.4%)에서 확인했고, 복합 열발작은 310건(9.8%)이었다. 2510명 중 890명(35.5%)이 열발작 재발을 경험했다.

표 1. Clinical characteristics of the study population (N = 3,172)

Variable	No (%)
Boys	1,906 (60.1)
Age Group	
6-12 mo	291 (9.2)
13-24 mo	1,460 (46.0)
25-36 mo	819 (25.8)
37-48 mo	414 (13.1)
49-60 mo	188 (5.9)
Hospitalization	539 (17.0)
Seizure duration	
≤ 1 min	994 (31.3)*
2-5 min	1,717 (54.1)*
6-15 min	331 (10.4)*
> 15 min	113 (3.6)*
Unknown	17 (0.5)*
Seizure type	
Generalized tonic	971 (30.6)*
Generalized tonic clonic	1,818 (57.3)*
Atonic	136 (4.3)*
Myoclonic	7 (0.2)*
Focal	44 (1.4)*
Atypical	157 (4.9)*
Unknown	39 (1.2)*
Family history	
None	2,129 (67.1)*
Parents	402 (12.7)*
Sibling	126 (4.0)*
Parents and sibling	19 (0.6)*
Others	100 (3.2)*
Unknown	396 (12.5)*
Complex febrile seizure	310 (9.8)
Concurrent disease	
Upper respiratory infection	2,079 (65.5)*
Acute gastroenteritis	37 (1.2)*
Acute otitis media	6 (0.2)*
Bronchitis	10 (0.3)*
Croup	11 (0.3)*
Hand-foot-and-mouth disease	30 (0.9)*
Vaccination	35 (1.1)*
Coronavirus disease 2019	12 (0.4)*
Unknown	952 (30.0)*

*The sums of proportions are not equal to 100% due to rounding.

그림 1. 및 그림 2.로 연도별 및 월별 열발작 관련 방문 건수, 코로나바이러스병-19 범유행 관련 방문 양상 변화를 나타냈다.




그림 1. Annual trend of febrile seizure-related visits from 2013 through 2022. It shows a decrease in 2018-2020, followed by a slight rebound since the starting point of coronavirus disease 2019 pandemic (arrow).




그림 2. Monthly trend of febrile seizure-related visits. As for total (solid line) and during 2013-2019 (dotted line), the frequent visits are noted in in January and April with troughs in October. Overall decrease in visits during 2020-2022 (dash line) is noted in comparisons with the visits total and during 2013-2019.

열발작의 재발은 남자, 5분 넘게 지속하는 발작, 열발작 가족력, 복합 열발작, 열발작 이후 진단된 뇌전증과 유의한 연관성을 보였다(표 2). 코로나바이러스병-19 범유행 이전 및 동안의 방문 양상을 비교한 결과, 범유행 동안 복합 열발작 빈도가 증가했고 열발작 재발은 감소했다(표 3.)

표 2. Comparisons of associated factors between the children with and without recurrence (N = 2,510)

Factors	With recurrence (N = 890)	Without recurrence (N = 1,620)	P value
Boys	563 (63.3)	936 (57.8)	0.007
Seizure duration > 5 min	148 (16.6)	206 (12.7)	0.007
Family history	211 (23.7)	262 (16.2)	< 0.001
Complex febrile seizure	118 (13.3)	129 (8.0)	< 0.001
Epilepsy	81 (9.1)	48 (3.0)	< 0.001
Developmental delay	55 (6.2)	76 (4.7)	0.109
Autism	5 (0.6)	10 (0.6)	0.863
Cerebral palsy	7 (0.8)	8 (0.5)	0.363

Values are expressed as numbers (%)

표 3. Clinical aspects of febrile seizures before and after the coronavirus disease 2019 pandemic

Factors	2017-2019 (N = 1,274)	2020-2022 (N = 383)	P value	Odds ratio*
Boys	751 (58.9)	235 (61.4)	0.400	1.11 (0.88-1.40)
Seizure duration > 5 min	177 (13.9)	54 (14.1)	0.916	1.02 (0.74-1.42)
Family history	395 (31.0)	152 (39.7)	0.248	0.79 (0.57-1.09)
Complex febrile seizure	119 (9.3)	53 (13.8)	0.012	1.56 (1.10-2.20)
Recurrence	629 (49.4)	128 (33.4)	< 0.001	0.49 (0.39-0.63)
Epilepsy	76 (6.0)	18 (4.7)	0.348	0.77 (0.39-1.49)
Delayed development	76 (6.0)	24 (6.3)	0.828	1.29 (0.70-2.36)
Autism	7 (0.5)	2 (0.5)	0.949	0.61 (0.19-5.66)
Cerebral palsy	11 (0.9)	1 (0.3)	0.223	NA

Values are expressed as numbers (%).

*Point estimates with 95% confidence intervals.

IV. 고찰

열발작은 12-36개월 남자가 같은 나이 여자보다 30%-100% 자주 발생하는 것으로 보고되며⁸⁻¹²⁾, 본 연구도 13-24개월(특히 남자)에서 호발하여 기존 연구와 일치했다. 열발작에서 유전적 소인의 연관이 추정되며 약 1/3은 가족력이 있는 것으로 알려졌다¹³⁾. 본 연구에서 가족력이 20.4%로 비교적 낮게 나온 것은 의무기록에서 가족력을 확인하지 못한 12.5% 또는 보호자가 응급실에서 가족력을 모를 경우 “없음”으로 기록된 것에 영향을 받은 것으로 생각한다. 본 연구에서 복합 열발작이 9.8%인 것은 기존에 보고된 단순 및 복합 열발작 빈도(각각 70% 및 25%)보다 낮다^{14,15)}. 이는 복합 열발작의 정의 중 “24시간 이내 2회 이상 발작” 항목을 고려하면, 귀가 직후 재발하여 외래 또는 외부병원을 방문한 경우가 단순 열발작으로 기록될 수 있다는 점에 기인한 것으로 추정한다.

열발작 원인으로 바이러스 감염이 가장 많은 것으로 알려진 것은 본 연구에서 상기도감염이 가장 흔하게 동반된 점과 일치한다(Table 1)¹⁶⁾. 코로나바이러스병-19는 12건(0.4%)이었지만, 응급실 방문 당시 검사가 시행되지 않은 경우 상기도감염으로 기록된 것으로 추정된다. 열발작은 겨울에 가장 많이 발생한다고 알려진 점은¹⁷⁾ 본 연구에서도 확인했다(Fig. 1).

본 연구에서는 총 890명(35.5%)이 열발작의 재발을 경험했다. 재발의 위험인자로는 발열 24시간 이내, 첫 열발작을 겪은 나이가 18개월 미만, 열발작 가족력 등이 알려졌다⁵⁾, 본 연구에서는 남자, 5분 넘게 지속하는 발작, 가족력, 복합 열발작이 재발과 유의하게 연관됐다. 발작 지속 시간이 재발과 연관되지 않았다는 기존 연구와 차이를 보였으며^{12,18)}, 이는 발작 지속 시간과 발작 발생에 대한 취약성의 연관을 시사하며, 재발 및 뇌전증 발생에도 영향을 미칠 수 있을 것으로 추정된다. 이 차이는 본 연구가 발작 지속 시간이 비교적 긴 환자가 자주 방문하는 3차 병원 응급실에서 이뤄진 것의 영향일 수 있다. 열발작 가족력과 재발의 연관은 기존 연구와 부합한다^{8,12)}. 복합 열발작은 재발의 위험인자로 알려졌다¹⁰⁾, 일부 연구에 따르면 열발작 양상에

따른 재발 위험성에 차이가 없다⁶⁾.

열발작 이후 뇌전증 위험성에 관한 여러 연구에 따르면, 뇌전증이 열발작을 경험하지 않은 환자의 0.5%, 단순 열발작 환자의 1%-2%에서, 복합 열발작 환자의 6%-8%에서 각각 진단된다¹⁹⁻²¹⁾. 뇌전증 위험인자는 첫 열발작에 선행하는 발달장애, 뇌전증 가족력, 복합 열발작 등이다²²⁾.

코로나바이러스병-19 범유행 동안 열발작 연관 응급실 방문은 감소했으나, 복합 열발작의 빈도는 약 1.6배 증가한 반면, 재발은 절반 정도로 감소했다. 재발 감소는 범유행기에 기타 감염질환 감소, 마스크 착용, 사회적 거리두기를 통해 발열 질환이 감소하여 열발작 빈도가 감소한 결과로 추정된다^{23,24)}. 또한 이 시기에 발열 질환이 있을 경우, 중증급성호흡증후군 코로나바이러스-2 검사 및 격리 병상 부족 등으로 3차 의료기관 방문이 제한됐다. 이에 따라 단순 열발작 환자의 응급실 방문이 감소하여, 상대적으로 복합 열발작이 숫점 감소에도 불구하고 빈도가 증가한 것으로 생각한다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 후향적으로 의무기록 검토를 통한 분석으로 자료의 부정확성 및 누락이 결과에 영향을 미쳤을 수 있다. 둘째, 추적 관찰이 2개 병원에서만 이뤄졌고, 범유행 동안 추적 관찰 기간이 2년 11개월 이내로 제한됐으므로, 열발작 재발 및 뇌전증 발생이 과소평가됐을 수 있다. 이 제한점이 재발이 복합 열발작 또는 뇌전증 발생과 연관됐다는 결과에 영향을 미쳤을 수 있다. 추후 빅데이터를 활용한 전국 규모 연구 혹은 전향적 연구를 통해, 열발작의 재발 및 장기 예후를 분석해야 한다.

V. 결론

요약하면, 10년간 열발작으로 2개 병원 응급실을 방문한 환자에서 열발작의 재발은 남자, 5분 넘게 지속하는 발작, 열발작 가족력, 복합 열발작인 경우에 자주 발생했다.

또한, 재발을 경험한 환자에서 이후 뇌전증을 진단받은 경우가 많았다.

코로나바이러스병-19 범유행 동안 열발작 연관 응급실 방문은 감소했으나, 복합 열발작 빈도가 증가하고, 열발작 재발 빈도는 감소했다.

참고문헌

1. Campbell A, McIntosh C. Forfar and Arneil's Textbook of Pediatrics 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 1992. P754-755.
2. Subcommittee on Febrile Seizures; American Academy of Pediatrics. Neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. *Pediatrics* 2011;127(2): 389-394.
3. Shinnar S, Glauser T.A. Febrile seizures. *J Child Neurol* 2002.17 Suppl 1:S44-S52.
4. Baumer JH. Evidence based guideline for post-seizure management in children presenting acutely to secondary care. *Arch Dis Child* 2004;89(3):278-280.
5. Nelson KB, Ellenberg JH. Prognosis in children with febrile seizures. *Pediatrics* 1978;61(5):720-727.
6. Berg AT, Shinnar S, Darefsky AS, et al. Predictors of recurrent febrile seizures: a prospective cohort study. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1997;151(4):371-378.
7. Berg AT, Shinnar S, Hauser WA, et al. Predictors of recurrent febrile seizures: a meta-analytic review. *J Pediatr* 1990;116(3):329-337.
8. Kim SH. Predictors of recurrent febrile seizure. *J Korean Child Neurol Soc* 2014;22(3):149-154.
9. Berg AT, Shinnar S, Hauser WA, Alemany M, Shapiro ED, Salomon ME, et al. A prospective study of recurrent febrile seizures. *N Engl J Med* 1992;327:1122-1127.
10. Noh JH, Koh ID, Song KS, Cha BH. Clinical characteristics and risk factors of multiple recurrent febrile seizures among children. *J Korean Child Neurol Soc* 2015;23;7-12.
11. Sadleir LG, Scheffer IE. Febrile seizures. *BMJ* 2007;334:307-311.
12. Bae EJ, Kim IC, Park WI, Kim BS, Lee HJ, Lee KJ. Risk factors for recurrence of febrile seizure in children. *J Korean Child Neurol Soc* 2001;9:368-374.
13. Aicardi J. *Epilepsy in children*. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996:253-75.
14. Patel N, Ram D, Swiderska N, et al. Febrile seizures. *BMJ*. 2015;351:h4240.
15. Seinfeld S, Pellock JM. Recent research on febrile seizures: a review. *J Neurol Neurophysiol*. 2013;4(165):19519.
16. Lee IG. Recent Advances in Febrile Convulsion. *Journal of the Korean Pediatric Society*

- 2000;43(8):1021-1028.
17. Mikkonen K, Uhari M, Pokka T, et al. Diurnal and seasonal occurrence of a febrile seizures. *Pediatr Neurol.* 2015;52(4):424–427.
 18. Pavlidou E, Tziritidou M, Kontopoulos E, Panteliadis CP. Which factors determine febrile seizure recurrence? A prospective study. *Brain Dev.* 2008;30:7-13.
 19. Nelson KB, Ellenberg JH. Predictors of epilepsy in children who have experienced febrile seizures. *N Engl J Med.* 1976;295(19):1029–1033.
 20. Verity CM, Golding J. Risk of epilepsy after febrile convulsions: a national cohort study. *BMJ.* 1991;303(6814):1373–1376.
 21. Annegers JF, Hauser WA, Shirts SB, et al. Factors prognostic of unprovoked seizures after febrile convulsions. *N Engl J Med.* 1987;316(9):493-498.
 22. Pavlidou E, Panteliadis C, Prognostic factors for subsequent epilepsy in children with febrile seizures. *Epilepsia.* 2013; 54(12): 2101-2107.
 23. Kim DH, Nguyen TM, Kim JH. Infectious respiratory diseases decreased during the COVID-19 pandemic in South Korea. *Int J Environ Res Public Health* 2021;18:6008.
 24. Park KH, Choe YJ, Shim YK, Eun BL, Byeon JH. Decrease in Incidence of Febrile Seizure following Social Distancing Measures: A National Cohort Study in South Korea. *Pediatr Infect Vaccine.* 2021 Dec;28(3):144-148.

ABSTRACT

Clinical aspects of patients visiting the emergency department with febrile seizures

Jong Min Kim

Department of Medicine

The Graduate School, Yonsei University

(Directed by Professor Soon Min Lee)

Purpose: We aimed to analyze the clinical characteristics, recurrence, neurological outcomes, and the impact of the coronavirus disease 2019 pandemic in children who visited the 2 emergency departments (EDs) with febrile seizures.

Methods: We retrospectively reviewed medical records of 3,172 episodes, involving 2,510 children aged 6-60 months whose diagnoses were febrile seizures at the EDs in 2 hospitals from 2013 through 2022. Through the review, we analyzed clinical characteristics and associated factors for the recurrence of febrile seizures. As a subanalysis, the variables were compared between before (2017-2019) and during (2020-2022) the pandemic.

Results: A total of 3,172 febrile seizure-related visits to the EDs were found in 2,510 children. Of these, 890 children (35.5%) underwent children recurrences of febrile seizures. The recurrence of febrile seizure was associated with higher percentages of boys (63.3% vs. 57.8%; $P = 0.007$), seizures lasting longer than 5 minutes (16.6% vs. 12.7%; $P = 0.007$), family history of the seizure (23.7% vs. 16.2%; $P < 0.001$), complex febrile seizures (13.3% vs. 8.0%; $P < 0.001$), and epilepsy diagnosed thereafter (9.1% vs. 3.0%; $P < 0.001$). During the pandemic, we noted a decrease in numbers of

febrile seizure-related visits to the EDs (from 1,274 to 383), an increase in percentage of complex febrile seizures (9.3% vs. 13.8%; $P = 0.012$), and a decrease in percentage of recurrent febrile seizures (49.4% vs. 33.4%; $P < 0.001$), compared to before the pandemic.

Conclusion: Our study identified factors associated with recurrence of febrile seizures, and confirmed the increase in complex febrile seizures and the decrease in the recurrence during the coronavirus disease 2019 pandemic. These findings could be helpful when caring children with febrile seizures in EDs.

Key Words : COVID-19; Epidemiology; Epilepsy; Recurrence; Seizures, Febrile

게재 List

1. Kim JM, Hwang HY, Lee JH, Kim MK, Lee SM. Clinical aspects of patients visiting the emergency department with febrile seizure. *Pediatr Emerg Med J* 2023;10(4):118-123